

# サレド<sup>®</sup>カプセル50 サレド<sup>®</sup>カプセル100 効能・効果及び用法・用量追加のお知らせ

謹啓

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、抗多発性骨髄腫剤「サレド<sup>®</sup>カプセル50」及び「サレド<sup>®</sup>カプセル100」につきまして下記の通り効能・効果が追加されましたので、お知らせ申し上げます。なお、内容物の成分、含量、品質等に変更はございません。引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬 白

平成 24 年 5 月

 藤本製薬株式会社

記

## ■ 既存の効能・効果

1. 再発又は難治性の多発性骨髄腫

## ■ 追加された効能・効果

2. らい性結節性紅斑

## ■ 追加された効能・効果に対する用法・用量

2. らい性結節性紅斑

通常、本剤を 1 日 1 回就寝前に経口投与する。用量は、成人にはサリドマイドとして 50～100mg より投与を開始し、症状が緩和するまで必要に応じて漸増する。ただし、1 日 400mg を超えないこと。症状の改善に伴い漸減し、より低い維持用量で症状をコントロールする。

「サレド<sup>®</sup>カプセル50」及び「サレド<sup>®</sup>カプセル100」は、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」での検討結果を受け、らい性結節性紅斑の効能追加に係る承認事項一部変更承認申請を行い承認されました。

## 【お願い】

今般の「効能・効果」及び「用法・用量」の追加に伴い「使用上の注意」も追加・改訂されております。「効能・効果、用法・用量の追加及び使用上の注意改訂のお知らせ」ならびに「改訂添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先 藤本製薬株式会社 サレド DI 室  
TEL:0120-425-171 FAX:072-332-5182  
Email:thaled-di@fujimoto-pharm.co.jp