

医療関係者の方へ

## ヨーデルS糖衣錠-80の取扱いに関するお願い

藤本製薬グループ  
藤本製薬株式会社

糖衣錠は吸湿性をもつ糖類で外側をコーティングした製剤です。そのため、湿度に弱く、高い湿度の状態では保管すると表面が溶けたようになっていたり、表面が変色したりすることがあります。

ヨーデルS糖衣錠-80は糖衣錠であり、梅雨時期から夏季の湿度の高い時期は、錠剤表面が溶けたり、成分が染み出て茶色に変色したり、含量が低下することがあります。最近では日本でも梅雨時期から夏季にかけて、湿度90%RH以上、温度30℃以上になることがありますので、調剤や保管については以下の通りご注意ください。よろしくお願いいたします。

## 1. 医療関係者の方へのお願い

- ・梅雨時期から夏季はできるだけ、一包化調剤を避け、PTPシートのまま調剤してください。
- ・自動分包機の中に入れてままだしないでください。できれば必要数量のみ自動分包機に入れてご使用いただくか、または夜間の保管にご注意ください。

## 2. 梅雨時期から夏季の患者様宅での保管に関するお願い

- ・浴室や洗面所、台所などの湿度の高い場所に置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所や窓の近くに置かないでください。
- ・車の中に放置しないでください。
- ・空き缶などの密閉できる容器でふたを閉めて保管してください(できれば乾燥剤を入れてください)。
- ・PTPシートは細かく切らずそのまま保管してください(1錠ずつに切り離すと硬い角で他のPTPシートに穴を開けて、湿気が入ることがあります)。

## 3. 患者様用資材





## ヨーデルS糖衣錠-80を服用されている方へ

このお薬は成分の周りを糖でコーティングした糖衣錠です。糖衣錠は湿度が高い梅雨時期や夏季に、表面の糖のコーティングが溶けたり、成分が染み出て茶色に変色したりすることがあります。

梅雨時期から夏季にかけて、保管される場合は下記の点に注意してください。

- ・浴室や洗面所、台所などの湿度の高い場所に置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所や窓の近くに置かないでください。
- ・車の中に放置しないでください。
- ・空き缶などの密閉できる容器でふたを閉めて保管してください(できれば乾燥剤を入れてください)。
- ・PTPシートは細かく切らずそのままの状態保管してください(1錠ずつに切り離すと硬い角で他のPTPシートに穴を開けて、湿気が入ることがあります)。

#### 4. 無包装状態での安定性試験の結果

条件		期間				
湿度	温度	開始時	1 日後	3 日後	7 日後	
90% RH	40℃		 糖衣溶け、艶無し (外観変化あり)	 内容物（茶色）が 溶け出し、表面が 茶色く変色	 変色進む	
	30℃		 変化なし	 糖衣溶け、艶無し (外観変化あり)	 茶色く変色	
条件		期間				
湿度	温度	開始時	1 週間後	2 週間後	4 週間後	12 週間後
75% RH	40℃		 変化なし	 茶色く変色	 変色進む	
	30℃			 変化なし	 変化なし	 変化なし

※代表的なものの写真を示す

無包装状態での安定性試験結果または患者様用資材をご入用の場合は、弊社 MR またはコールセンターにお問い合わせください。

**【製品のお問い合わせ先】**  
 藤本製薬株式会社 学術部  
 TEL : 0120-225-591 FAX : 0120-116-026  
 受付時間：月～金 9：00～17：00（土日・祝日及び弊社休業日を除く）