

フジケノン[®]粒状錠125

投与方法について 成人

1

フジケノン[®]粒状錠125とは



※画像はイメージです

1スティック中にケノデオキシコール酸として125mg含まれています。

1錠中にケノデオキシコール酸25mgを含有する錠剤が1スティック中に5錠含まれています。

2

禁忌

胆道閉塞のある患者

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3

用法及び用量

【成人の場合】

通常、成人にはケノデオキシコール酸として1日量250mgより投与開始し、250mgずつ増量した後、維持量として1日量750mgを、1日3回に分けて連日経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日量として1000mgを超えないこと。また、1回あたりの投与量として375mgを超えないこと。

1日投与量250mg



1日投与量500mg



1日投与量750mg



本剤の維持量への漸増は2週間毎を目安に行うこと。

本剤以外のケノデオキシコール酸製剤から本剤に切り替える場合、当該ケノデオキシコール酸製剤と同じ用量から本剤を開始することができる*。

※出典：フジケノン粒状錠125審査結果報告書p.29 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA))

https://www.pmda.go.jp/drugs/2025/P20250929001/670142000_30700AMX00238_A100_1.pdf

具体的な投与方法および調剤時の注意事項等については裏面をご確認ください。▶

4

朝・昼・夕の投与方法

1日投与量			投与錠数/スティック数			注意事項
mg	スティック数	錠数	朝	昼	夕	
125	1	5	2錠	2錠	1錠	スティックを開封し、一包化調剤してください
250	2	10	4錠	3錠	3錠	
375	3	15	スティック 1	スティック 1	スティック 1	スティックのまま調剤してください。
500	4	20	スティック 2	スティック 1	スティック 1	
625	5	25	スティック 2	スティック 2	スティック 1	
750	6	30	スティック 2	スティック 2	スティック 2	
875	7	35	スティック 3	スティック 2	スティック 2	
1000	8	40	スティック 3	スティック 3	スティック 2	

備考:スティックのまま調剤可能な場合でも医師の裁量によりスティックを開封して一包化調剤することも可能

朝夕の各々のスティック数および錠数については、医師の裁量により変更可能

5

嚥下困難な患者様への調剤について

- 嚥下困難な患者様の場合は、一日投与量を粉碎して「分3」で調剤してください。
- 粉碎調剤の場合は、水またはぬるま湯、服薬ゼリーに懸濁して服用することもできます。懸濁後は速やかに服用してください。

6

処方箋に記載する場合の注意事項

- 処方箋には、1回あたりの用量および一包化調剤することを必ず記載してください。
- 調剤時に「mg」「スティック数」「錠数」を間違えないため、必ず単位を記載してください。

例 1日250mgの場合

フジケノン粒状錠125 1日2スティック 30日分
朝4錠 昼3錠 夕3錠 一包化

7

調剤時の注意事項

- 処方箋に記載されている単位(mg、スティック数、錠数)を必ず確認してください。
- 無包装状態および粉碎での安定性試験で4ヶ月安定であることを確認していますので、この範囲での調剤をお願いします。
- 一包化または粉碎調剤から、4ヶ月を過ぎたものは服用しないよう患者様に伝えてください。

 藤本製薬グループ

製造販売元
藤本製薬株式会社
〒580-8503 大阪府松原市西大塚1丁目3番40号

【お問い合わせ先】
藤本製薬株式会社 学術部
TEL: 0120-225-591 FAX: 0120-116-026
受付時間: 月～金 9:00～17:00
(土日・祝日及び弊社休業日を除く)